1. (55 점) 다음은 Au에 대한 Latimer Diagram의 일부이다.

- $[\text{Au}(\text{SCN})_4]^-$ 의 nomenclature를 써라.
- $[\text{Au}(\text{SCN})_2]^-$ 의 nomenclature를 써라.
- $[\text{Au}(\text{SCN})_4]^- \rightarrow \text{Au}$ 환원 반쪽 반응의 균형방정식(Balanced Equation)을 쓰고 표준환원전위(Standard Reduction Potential)를 구하여라.
- $\text{Au}^{3+} \rightarrow \text{Au}$ 환원 반쪽 반응의 균형방정식(Balanced Equation)을 쓰고 표준환원전위(Standard Reduction Potential)를 구하여라.
- 위의 Latimer Diagram을 바탕으로 Frost Diagram을 그려라. (좌표를 정확하게 표기하라.)
- $[\text{Au}(\text{SCN})_4]^-$ 의 formation constant를 구하여라.

2. (20점) $[\text{Cr}(\text{PMe}_3)_3\text{Cl}_3]$ 는 Octahedral 구조를 가지고 두 종류의 이성질체(Isomer)가 존재한다.

(Me = $-\text{CH}_3$)

- 두 이성질체의 구조를 그리고 각각 명명하여라. ($x-[\text{Cr}(\text{PMe}_3)_3\text{Cl}_3]$ 의 형태로 써라)
- 용액 상태에서 ^{31}P NMR 실험을 하면 위의 두 이성질체를 구별할 수 있다. 각 이성질체에 몇 개의 ^{31}P signal이 존재할지 예측해 보아라. ($^1\text{H}-^{31}\text{P}$ coupling은 고려하지 말아라. 즉 $^1\text{H}-^{31}\text{P}$ coupling은 zero라고 가정하여라.)

3. (30점) 전이금속이온의 5개의 d-orbital들은 free ion 상태나 uniform field 안에서 축퇴(degenerate) 되어 있다. 이온이 착물을 형성할 때 즉 d-orbital이 결정장(crystal field)에 들어갈 때, 중첩이 깨어지고 d-orbital들의 energy level이 갈라지게 된다.

- Uniform field, octahedral field, octahedral field가 tetragonal distortion (axial elongation)이 일어났을 경우, square planar field, 그리고 tetrahedral field에서의 d-orbital energy level diagram을 그려라. (d-orbital을 정확히 표시하고 각 field 사이의 correlation을 표시하라.)
- Octahedral field에서 (a)의 energy level이 나타나는 이유를 적어라.

4. (20점) Acidic condition에서 $E^\ominus(\text{MnO}_4^-(\text{aq})/\text{MnO}_2(\text{s})) = 1.69 \text{ V}$ 이다.

- $\text{MnO}_4^-(\text{aq}) \rightarrow \text{MnO}_2(\text{s})$ 환원 반쪽 반응의 균형 방정식을 써라.
- 위 환원 반응의 전위 (Reduction Potential)을 pH와 $[\text{MnO}_4^-]$ (MnO_4^- 의 농도) 의 함수로 표시하여라.
- pH = 9.00. $[\text{MnO}_4^-] = 0.25 \text{ M}$ 일 때 환원전위는?

5. (30점) 일반적으로 CN^- 는 H_2O 보다 열역학적으로 더 안정된 착물을 형성한다. (Hint: low spin, high spin, spectrochemical series)

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} + e^- \rightarrow [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 의 표준환원전위는 0.36 V 이고

$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} + e^- \rightarrow [\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 의 표준환원전위는 0.77 V 이다.

(a) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 와 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 중에서 어느 것이 더 안정한가?

(b) (a)의 이유를 LFSE (Ligand Field Stabilization Energy)를 이용하여 설명하여라.

(c) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 와 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 중에서 어느 것이 더 안정한가?

(d) 위의 표준환원전위를 보이는 이유는 H_2O ligand가 CN^- 로 치환되는 반응에서 CN^- 가 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 를 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 보다 더 많이 안정시키기 때문이다. 그 이유를 LFSE를 이용하여 설명하여라.

6. (55점) O_h point group의 character table을 이용하여 전이금속착물 (예를 들어 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$)의 MO (Molecular Orbital) diagram을 완성하여보자.

(a) Central Co^{3+} 의 4p, 4s, 3d orbital들의 symmetry type은?

(b) NH_3 의 비공유전자쌍 (lone pair)은 착물을 형성하는데 σ -donor 로써 작용한다. 이 여섯 개의 σ -donor orbital들을 ligand로부터 metal ion으로 향한 6개의 화살표로 표시하자. 이 여섯 개의 화살표를 basis로하여 O_h point group에서의 reducible representation을 구하여라.

(c) (b)의 reducible representation을 irreducible representation (symmetry type)들의 합으로 표시하여라.

(d) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 의 MO energy level diagram을 그려라. ligand splitting parameter (Δ_o)를 diagram에 표시하여라.

(e) 전자배치 (electron configuration)는 어떻게 되는가?

(f) (d)의 MO로부터 배위결합 (coordination)을 설명하여라.

(g) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 의 spin quantum number는?

(h) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 의 LFSE는?

7. (20점) 다음 착물의 nomenclature를 쓰거나 조성식을 쓰고 구조를 그려라.

(a) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$

(b) $[\text{Ni}(\text{CN})_2]^{2-}$

(c) pentaamminechlorocobalt(III)

(d) *cis*-dichlorobis(ethylenediamine)ruthenium(II)

8. (20점) 교과서의 6장과 7장의 내용 중 스스로가 자신있는 부분에 대하여 문제를 내고 풀어라. (되도록이면 위의 내용과 중복이되지 않도록 하라.)